

**PATENT ABSTRACTS OF JAPAN**(11)Publication number : **05-310581**(43)Date of publication of application : **22.11.1993**

(51)Int.Cl.

**A61K 31/765**(21)Application number : **04-147920**(71)Applicant : **KOKEN KK**(22)Date of filing : **15.05.1992**(72)Inventor : **KATO HARUKI  
NAGANUSHI YOUICHIROU****(54) GROWTH INHIBITOR FOR MALIGNANT TUMOR CELL OF ANIMAL INCLUDING HUMAN****(57)Abstract:**

**PURPOSE:** To provide a growth inhibitor for malignant tumor cells of animals including human, low in side effects and excellent in pharmacological effects.

**CONSTITUTION:** L-lactic acid is heated at the ordinary pressure or a reduced pressure in an atmosphere of an inert gas such as nitrogen gas and the resultant reaction solution is dissolved in methanol or ethanol in a hot state. The obtained solution is allowed to stand for cooling and subsequently filtered. The resultant filtrate is dissolved, after drying under vacuum or directly, in acetonitrile and the obtained solution is equilibrated with a 25% aqueous acetonitrile solution having pH2.0 to 3.0 in advance. The equilibrated solution is then subjected to column chromatography by using a reverse phase ODS or DS column. After elution with a 30 to 50% aqueous acetonitrile solution of pH2 to 3, the second elution is carried out with a  $\geq 70\%$  aqueous acetonitrile solution of pH2 to 3 so as to obtain a fraction composed of a mixture containing a straight chain condensate having 5 to 23 condensation degree and a cyclic condensate having 2 to 15 condensation degree. This fraction is used as a growth inhibitor for malignant tumor cells.

**LEGAL STATUS**

[Date of request for examination] 02.04.1999

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number] 3425968

[Date of registration] 09.05.2003

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

**BEST AVAILABLE COPY**

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-310581

(43)公開日 平成5年(1993)11月22日

(51)Int.Cl.<sup>5</sup>

A61K 31/765

識別記号

ADU

庁内整理番号

8314-4C

FI

技術表示箇所

審査請求 未請求 請求項の数1(全8頁)

(21)出願番号 特願平4-147920

(22)出願日 平成4年(1992)5月15日

(71)出願人 000162940

興研株式会社

東京都千代田区四番町7番地

(72)発明者 加藤 陽樹

埼玉県飯能市大河原140-1

(72)発明者 長主 陽一郎

神奈川県大和市中央3丁目9番4号

(74)代理人 弁理士 竹本 松司 (外2名)

(54)【発明の名称】 人を含む動物の悪性腫瘍細胞増殖抑制剤

(57)【要約】

【目的】 副作用が少なく、薬理効果に優れた人を含む動物の悪性腫瘍細胞増殖抑制剤を提供する。

【構成】 L-乳酸を常圧または減圧下で窒素ガス等の不活性ガスの雰囲気中で加熱し、得られた反応液をメタノール又はエタノールに熱時溶解解放冷後、濾過し、濾液を減圧乾燥後アセトニトリルに溶かすか、または直接アセトニトリルに溶かした溶液を予めPH2.0~3.0の25%アセトニトリル水溶液で平衡化しておいて、逆相系ODS又はDSカラムでカラムクロマトグラフィーを行い、PH2~3の30~50%アセトニトリル水溶液で溶離後、PH2~3の70%以上のアセトニトリル濃度の水溶液で溶離した画分であって、縮合度が5~23の直鎖状縮合物と縮合度が2~15の環状縮合物との混合物からなる。

BEST AVAILABLE COPY

(2)

特開平5-310581

1

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 L-乳酸を常圧又は減圧下で窒素ガス等の不活性ガスの雰囲気中で加熱し、得られた反応液をメタノール又はエタノールに熱時溶解後冷後、濾過し、濾液を減圧乾燥後アセトニトリルに溶かすか又は、直接アセトニトリルに溶かした溶液を予めPH2.0～3.0の2.5%アセトニトリル水溶液で平衡化しておいた逆相系ODS又はDSカラムでカラムクロマトグラフィーを行い、PH2～3の30～50%アセトニトリル水溶液で溶離後、PH2～3の70%以上のアセトニトリル濃度の水溶液で溶離した画分であって縮合度が5～23のL-乳酸直鎖状縮合物と縮合度が2～15のL-乳酸環状縮合物との混合物よりなる人を含む動物の悪性腫瘍細胞増殖抑制剤。

## 【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】本発明は、人を含む動物の悪性腫瘍細胞増殖抑制剤に関するものである。

【0002】

【従来の技術】これまで、各種の人を含む動物の悪性腫瘍細胞増殖抑制剤及びその製造方法が提案されているが、それらの多くは化学的合成法や生体系を利用する製造法で製造されたものであり、その多くは副作用が強かったり、あるいは生産性が低く実用できなかったりし、満足の行く人を含む動物の悪性腫瘍細胞増殖抑制剤が提案されていないのが現状である。

【0003】例えば、人を含む動物の悪性腫瘍抑制剤及びその製造方法が、特開昭59-33223号、特開昭60-28930号として提案されている。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】こうした事情に鑑み、本発明者は副作用が少なく、薬理効果の優れた人を含む動物の悪性腫瘍細胞増殖抑制剤について鋭意研究を重ねた結果、L-乳酸の低縮合物に人を含む動物の悪性腫瘍細胞増殖抑制剤作用があることを発見した。

【0005】この発見に基き、本発明は、副作用の少ない薬理効果の優れた人をも含む動物の悪性腫瘍細胞増殖抑制剤を提供することをその目的とするものである。

【0006】

【課題を解決するための手段】上記目的を達成する本発明は、L-乳酸を常圧または減圧下で窒素ガス等の不活性ガスの雰囲気中で加熱し、得られた反応液をメタノール又はエタノールに熱時溶解後冷後濾過し、濾液を減圧乾燥後アセトニトリルに溶かすか、又は、直接アセトニトリルに溶かして溶液をPH2.0～3.0の2.5%ア

2

直鎖状縮合物と、縮合度nが2～15のL-乳酸環状縮合物との混合物よりなることを特徴とする人を含む動物の悪性腫瘍細胞増殖抑制剤である。

【0007】加熱は、120℃以上200℃以下の任意の温度で行うか、または温度を一定にして、反応系の圧力を順次減圧して反応液としてL-乳酸低縮合物を得、次いでこのL-乳酸低縮合物をメタノールに溶解懸濁し、一定温度の雰囲気中で平衡化して放冷する。

【0008】逆相系ODSまたはDSカラムではアセトニトリル濃度を順次上げてステップワイス溶出を行う。

【0009】前記製造法において、乳酸低縮合物は、常圧下、水が溜出し、L-乳酸モノマーの蒸気圧の低い温度例えば145℃で加熱し、共存水分を除いた後、150～200mmHgに減圧し、更に150～160℃、10～20mmHgに保ち最後に180～200℃、3～5mmHgで2時間以内加熱し残存モノマーその他低沸点物質を除く方法とか、160～170℃、100～200mmHgの条件下に加熱するとかして製造したもので、メタノールによる上限カットで残存モノマーの少ない2, 3, 4, 5, 6, ……18, 19, 20, 21, 22, 23と連続した縮合度の低縮合物となる。

【0010】このようにして得られた本発明のL-乳酸縮合物の分画物の質量分析結果を図1、2又縮合度n=13分画物の分析結果を図3に示す。同図から明らかなように乳酸低縮合物は直鎖状縮合物と環状低縮合物とが混在した状態になっている。

【0011】なお、図中、△は乳酸の環状縮合物、その他の数値は乳酸の直鎖状縮合物を示す。

【0012】上記製造に当たり、L-乳酸の低縮合物の縮合度は、縮合反応時に共存する水分量及び反応温度を適宜調整することにより容易に制御できる。

【0013】一般に、L-乳酸(α-ヒドロキシプロピオン酸)は室温では液体で、通常2分子が水素結合した状態で存在し、その濃厚溶液中にはlactic anhydride(2分子縮合したもの)が10～15%含まれ、加熱により容易に脱水縮合し、低縮合物に転化し、さらに、容易に高分子化し固化するといわれている。

【0014】上記本発明の人を含む動物の悪性腫瘍細胞増殖抑制剤(以下抑制剤と言う)は、乳酸の前記性質を利用して製造したもので、乳酸を低縮合物に、転化し、それをカラムクロマトグラフィーにより分画し、人を含む動物の悪性腫瘍細胞増殖抑制作用を有する活性画分を採取することにより得られた剤である。

【0015】本発明の剤は質量分析によれば直鎖状低縮

BEST AVAILABLE COPY

(3)

特開平5-310581

3

能である。分析上は凡そ縮合度 $n$ が4以上の環状縮合物と(ラクチド)と直鎖状縮合物とは大まかに分けることができるが、縮合度 $n$ が2, 3のラクチドは直鎖状縮合物と挙動を共にするところから分離することができない。このことは親和力が強いばかりでなく、閉じ込められた系内で一種の可逆平衡関係が成立しているものと推定できる。

【0016】上記乳酸低縮合物は粘着性が強く、凝集しやすい。一見透明に見える溶液であっても単分離したものとはいえない挙動を示す。この低縮合物は低濃度で界面活性作用を有しており水溶液中で乳酸低縮合物のミセルあるいは逆ミセルが形成される。これが抑制剤をして悪性腫瘍細胞の第1バリアー層である細胞膜の通過を容易ならしめ、薬理効果を上げるものと推定できる。

【0017】

【実施例1】

製造例1

L-乳酸500mlを高圧で下降形接続管及び窒素ガス導入管を備えたセパラブルフラスコに入れ、マントルヒーターで145℃で3時間保った後、150mmHgに減圧して2時間加熱し、更に、155℃、10mmHgで2時間加熱後、185℃で1.5時間加熱して目的の低縮合物を得た。

【0018】この低縮合物をまだ流動性がある内に2倍量のメタノールに分散し、それを濾過して得た濾液を減圧乾燥し、上限カットしたL-乳酸低縮合物とした。この混合物をアセトニトリルに溶解し、予めアセト\*

4

\*ニトリル25%塩酸酸性溶液(PH=2.0)で平衡化しておいた逆相ODSカラム(ケムコLC-sorbSP-C-ODSカラム)にかけ、PH2.0のアセトニトリル25%、50%、100%の塩酸酸性溶液で順にステップワイス溶出を行い、その溶出画分を中和し、数回エタノール置換した後、減圧乾燥しプロピレングリコールに溶解し、夫々抑制剤1, 2および3を得た。

【0019】

【実施例2】

製造例2

L-乳酸を160℃、200mmHg、窒素ガス雰囲気中の下降形接続管200~300ml/minで導入しながら、5時間攪拌した。得られた低縮合物をメタノールに溶解し、その濾液を減圧乾燥した後、アセトニトリルに溶解した。これを25%アセトニトリル塩酸酸性溶液(PH=2.0)で平衡化しておいた逆相ODSカラムにかけ、アセトニトリル25%、40%、80%の塩酸酸性溶液で3段階のステップワイス溶出を行い、実験1と同様にその溶出画分を順に抑制剤1', 2', 3' とした。

【0020】

【実施例3】

急性毒性試験1

雄マウスに製造例1で得られた抑制剤2を静脈注射し、1週間体重変化を観察した。その結果を表1に示す。

【0021】

【表1】

投与量 (mg/kg)	体重(g)		
	0	4日	7日
250	30.4 (死亡) 30.8 (死亡)		
125	32.3 30.8	32.8 31.0	31.8 31.2
62.5	31.4 30.6	31.2 30.2	31.2 31.2
31.3	32.4 30.4	31.9 30.8	32.8 30.2

【0022】

【実施例4】

急性毒性試験2

(i) ウサギの動脈に抑制剤3を投与し、1, 4, 7

日目の体重を秤量した結果を表2に示す。比較例としてアドレマイシンを投与した結果も示す。

【0023】

【表2】

BEST AVAILABLE COPY

(4)

特開平5-310581

5

6

投与剤	体重 (g)		
	1 日	2 日	3 日
抑制剤3 6mg/head	2. 2 2. 1 2. 1	2. 1 2. 1 2. 1	2. 3 2. 1 2. 2
アドレマイ シン 6mg/head	2. 2 2. 0 2. 2	2. 3 2. 0 2. 2	2. 3 死亡 2. 3

【0024】

【実施例5】

急性毒性実験3

(1) マウスC57Black (8週令) 10匹の尾部の血管に抑制剤2を1日1回連続10回投与した。その後、10日経過を見た結果、外観的に変化はなく死亡率0であった。

投与量 : 50mg/ml 溶液0. 2ml (400mg/kg)

(2) ノードマウス雌4週令10匹の背側部皮下に抑制剤2を1日1回投与した。その後10日経過を見た結果、死亡率は0であった。

投与量 : 50mg/0. 5ml H<sub>2</sub>O (約2. 5g/kg相当)

(3) ビーグル犬 雌 6ヶ月令体重7kgに抑制剤3を1日1回連続静脈注射し10日間観察した結果、外観に特別の異常反応は認められなかった。(臨床的変化なし)。

投与量 : 0. 7g (100mg/kg)

【0025】

【実施例6】

悪性腫瘍細胞増殖抑制試験1

ノードマウスICR NU/NU 雌4週令の背側部皮下に、人の悪性腫瘍細胞(株細胞)としてHela Cell (人子宮頸部癌株細胞) 及びKB (人鼻咽頭癌株細胞) を移植し、移植後3日目より、実験群には抑制剤1を1日1回計11回連続投与し、対照群には生理的食塩水を同様に投与した。その後投与を停止し、移植後7週目に腫瘍を取り出し秤量した。但し、抑制率は次式で与えられる。

抑制率 =  $(1 - \text{実験群の腫瘍重量g} / \text{対照群腫瘍重量g}) \times 100\%$

表3乃至4にその結果を示す。

【0026】(1) Hela Cell (人子宮頸部癌

以下に示す。

【0027】

【表3】

No	対照群 (g)	実験群 (g)
1	2. 71	1. 10
2	3. 31	1. 17
3	2. 11	0. 96
4	2. 94	1. 30
5	3. 35	1. 35
$\Sigma x$	14. 96	6. 41
x平均	2. 99	1. 28

抑制率57. 1%

(1) KB (人口腔底癌株細胞)

移植数 : 1×10<sup>7</sup>

投与量 : 20mg/0. 2ml

結果 : 対照群と実験群ともに5例の腫瘍重畳を以下に示す。

【0028】

【表4】

No	対照群 (g)	実験群 (g)
1	6. 64	2. 37
2	6. 33	3. 32
3	6. 19	1. 91
4	6. 02	2. 23
5	6. 78	3. 04
$\Sigma x$	31. 96	12. 87
x平均	6. 39	2. 57

抑制率59. 8%

【0029】

【実施例7】

悪性腫瘍細胞増殖抑制試験2

マウス肺癌細胞

BEST AVAILABLE COPY

(5)

特開平5-310581

7

8

【表5】

No	対照群 (g)	実験群 (g)
1	3.95	2.44
2	4.20	1.87
8	4.56	2.24
4	3.20	2.40
5	4.48	2.10
$\Sigma x$	20.39	10.26
$\bar{x}$ 平均	4.08	2.05

## \* 【実施例8】

悪性腫瘍細胞抑制試験3

吉田肉腫

ラットに吉田肉腫を移植し腫瘍の形成後抑制剤2.2mg/kg, 10mg/kgを7日経断連続投与し、7日間腫瘍サイズ(mm)を測定した結果を表6に示す。対照群に生理食塩水を同量投与した。また、陽性対照薬としてアドリアマイシンを用いた結果をも示す。

【0032】

10 【表6】

【0031】

\*

群		動物番号	吉田肉腫の大きさ (mm <sup>3</sup> ) / 日			
			2	3	5	7
対 照 群		1	1512	3150	6650	13440
		2	50	98	600	3456
		3	50	228	1792	6500
		4	18	40	352	858
		5	126	180	1638	3795
		6	660	770	6804	12768
		Mean±S. D.	395	744	2973	6803
抑制剤2	2mg / Kg	16	520	924	3600	5382
		17	1092	1390	3078	5616
		18	147	256	3360	4992
		Mean±S. D.	586	857	2346	5330
	10mg / Kg	19	624	1560	3300	5525
		20	108	147	256	630
		21	224	450	1755	3366
		22	1183	1547	3927	5434
		23	416	960	4522	2394
		24	528	1014	1456	1786
		Mean±S. D.	514	930	2536	3189
		アドリアマ イシン	2mg / Kg	34	320	972
35	256			864	540	360
36	2448			4840	3960	4320
37	324			864	720	920
38	308			1368	1050	986
39	105			648	384	432
Mean±S. D.	627			1593	1261	1265

BEST AVAILABLE COPY

(5)

特開平5-310581

9

10

【表7】

群	動物番号	V X 2 癌サイズ (mm <sup>3</sup> )		死 滅 状 況	
		投与前	投与後	V X 2 癌	正常肝臓
抑制剤2 8mg/head	16	270	476	中心部死滅	NR
	17	225	320	中心部死滅	NR
	18	270	336	ほぼ死滅	NR
	Mean±S. D.	255	377		
抑制剤3 8mg/head	19	150	120	完全死滅	NR
	20	270	104	完全死滅	死滅(16mm <sup>3</sup> )
	21	340	264	完全死滅	NR
	Mean±S. D.	253	162		
アドリアマイ シン 6mg/head	25	180	100	出血死	NR
	26	270	dead	—	—
	27	270	330	中心部死滅	NR
	Mean±S. D.	240	—		

上記のとおり、癌のサイズ=癌の長径×短径はマウスでは有意差がやっと出る程度であるが、ラット、ウサギと大きな動物になるにしたがって顕著な薬理効果が見られた。

【0035】

【実施例10】

臨床例

方法：抑制剤3の100mgをプロピレングリコール1mlに溶かした溶液（以下抑制剤3溶液という）を作成し、体重1Kg当たり抑制剤30mg（抑制剤約0.3ml換算量）をビタミン剤、ブドウ糖等の点滴液に加えて混合し、点滴静注した。投与は1日1回5回投与後3日中止し、9日目よりまた連日5回投与し、以後患者の状況を時間の経過と共に観察した。

【0036】例1：胃癌

鶏卵大の腫瘍をもち、出血している患者（60才男）に抑制剤3液15mlをブドウ糖点滴液500mlに混合し、前記方法で投与したところ、5日目で薬効が現れ、出血が停止し、食欲が出て体調が回復してきた。更に、レントゲン検査で薬効を追跡し、腫瘍の縮小化が認められた。これは、胃カメラによっても確認された。

もに顕大化した腫瘍およびリンパ節が縮小してきた。同時に体力も回復し薬効に対する充分な有意さを示した。

【0038】例3：肺癌

やはり大きくなった気管支癌の患者（55才男）に抑制剤3液15mlをブドウ糖点滴液500mlに混合し、同様な方法で投与した。投与後5日目には効果が見られ、喀痰中の血液は消失し、癌細胞は著しく減少し、全身状態の改善が見られるようになった。2ヶ月後のX線検査では腫瘍は縮小し、同時に体力の著しい回復が見られた。

【0039】例4：子宮癌

出血を伴う子宮頸癌患者に抑制剤3液12mlをブドウ糖点滴液500mlに混合し同様な方法で投与した。投与後4～5日で出血がとまり、症状の改善が見られ、1ヶ月経っても出血していない。2ヶ月後CTスキャンにより腫瘍の縮小化が確認した。2ヶ月後のX線検査では腫瘍は縮小し、同時に体力の著しい回復が見られた。

【0040】

【発明の効果】本発明は、実施例1で明かなように投与後数日で抑制効果が見れ初め、10回投与後は中止してもその後の悪性腫瘍細胞の増殖が認められず、長期間

BEST AVAILABLE COPY

(7)

特開平5-310581

11

12

したところ、ウサギ肝癌由来化細胞VX2の浸潤や増殖は抑制され、殆どの癌細胞は死滅した。また、吉田肉腫に対する作用も表6に示すように、陽性対照薬であるアドリアマイシン程の薬理効果が見られないものの癌抑制作用が充分に窺える。さらに、本発明の抑制剤が生体に存在するL-乳酸のオリゴマーであり、かつ実施例3及び実施例4に見られるように生体に対する副作用がないことが窺える。これらをも含めた総合的評価から見れば、前記アドリアマイシンより高い評価を得ることができると思慮する。

\*10


\*【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施例の抑制剤2の質量スペクトル線図。


【図2】本発明の実施例の他の抑制剤3の質量スペクトル線図。

【図3】ODSカラムクロマトグラフィーで濃度勾配溶出で分取した縮合度 $n=13$ の質量スペクトル線図（直鎖状縮合物の縮合度 $n=13$ に対し環状縮合物の縮合度 $n=11$ まで存在している。）。

【図1】



【図3】



BEST AVAILABLE COPY



(8)

特開平5-310581

【図2】

